

T2.15. 必要性. $A \sim B$ 即 $A = P^{-1}BP$.

$$R(aE - A)^k = R(P(aE - B)^k P^{-1}) = R(aE - B)^k.$$

充分性: 不妨考虑.

$$A = \begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda) & \\ & J_{n_2}(\lambda) \end{pmatrix}$$

更多 λ 的 Jordan 块以及不同特征值的情况类似.

$$= \left[\begin{array}{c|c} \begin{matrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{matrix} & \\ \hline & \begin{matrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{matrix} \end{array} \right]$$

\therefore 取 $a = \lambda$, k 分别取 $1, 2, \dots, \max\{n_1, n_2\}, \max\{n_1, n_2\} + 1$ 即可确定.

B 也有 $J_{n_1}(\lambda), J_{n_2}(\lambda)$ 这两个 Jordan 块. 从而 $A \sim B$. □

T2.19. (1) 容易验证. W 的定义实际上就是 0 特征值对应的核子空间.

(2) 不妨考虑:

← λ 对应的若干个 Jordan 块.

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{J(\lambda)} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{J(0)} \end{pmatrix}$$

→ A^k 后全部为 0 . 且应该就是这个 $m \times m$ 阶的方阵.
 $\therefore k \geq m$ 即可

于是就得: ($k \geq m$) $R(A^k) = n - m$. □

T2.18. 可以确定 $A \sim J_3(0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{bmatrix}$. 可由几何重数直接得到.

问题变为 $X^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{bmatrix}$ 无解. 首先 X 的特征值也全为 0 .

$$\therefore \exists P \text{ s.t. } PXP^{-1} = J \quad J = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{bmatrix} 0 & 1 & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

而 $R(X^2) = R(J^2) \leq 1 \neq R(A)$. 矛盾. □

提问: 如果 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$, 那 $X^2 = A$ 有解吗?

T2.12. (1) 可知:

$$A \sim \begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_k}(\lambda_k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda_{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \Lambda_{\lambda_k} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} N & & \\ & \ddots & \\ & & N \end{pmatrix}$$

$\parallel \Delta$
 $\parallel \Delta$
 S
 N

S, N 的分解的确是唯一的, 且 $SN = NS$ 是容易验证的.

只需验证 S, N 均可写为 A 的多项式.

先考虑 $A_i = \begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda_i) & \\ & J_{n_2}(\lambda_i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$

$\parallel \Delta$
 $\parallel \Delta$
 S
 N

相同特征值.

而 $S = d_{n_i}(A_i) + \lambda E$ 是 A_i 的多项式. \Rightarrow 自然 $N = A_i - S$ 也是.

而不同 λ 之间能否有这样的结果?

现今 $A_2 = \begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda_1) & \\ & J_{n_2}(\lambda_2) \end{pmatrix}$ 由于 $d_{J_{n_1}(\lambda_1)}(x)$ 与 $d_{J_{n_2}(\lambda_2)}(x)$ 互素.

\therefore 由 中国剩余定理 $\exists f(x)$ s.t. $\begin{cases} f(x) \equiv \lambda_1 \pmod{d_{J_{n_1}(\lambda_1)}(x)} \\ f(x) \equiv \lambda_2 \pmod{d_{J_{n_2}(\lambda_2)}(x)} \end{cases}$ □.

(2) 类似的讨论, 此时

$$A_2 = J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

$\parallel \Delta$
 $\parallel \Delta$
 S
 N

因此需要 $\lambda \neq 0$, i.e. A 可逆. □

T2.13. 同样的, 我们只需考虑将 $A \sim J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$ 按要求分解即可.

$$\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

$\parallel \Delta$
 $\parallel \Delta$
 \bar{S}
 \bar{T}

那么此时的 $A = P^{-1} \bar{S} \bar{T} P = \underbrace{(P^{-1} \bar{S} (P^{-1})^T)}_S \underbrace{(P^T \bar{T} P)}_T$ □

T2.11. $A^k=0 \rightarrow A \sim \begin{bmatrix} N_1 & & \\ & \ddots & \\ & & N_k \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix} = J(0).$

对其中一个 Jordan 块去考虑: 即 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \boxed{A^m=0} \quad m < k.$

$\therefore I+A = J(1)$, 因此要证: $I+A+\dots+\frac{A^m}{(m-1)!} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2!} & \dots & \frac{1}{(m-1)!} \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$ 特征值只有 1

与 $J(1)$ 相似. $\Leftrightarrow B$ 有一个 $J(1)$ 的 Jordan 块

$\Leftrightarrow B$ 对于 $\lambda=1$ 的几何重数 = 1. 对应于 Jordan 块个数 (1)

而可以知道: $R(E_n - B) = n-1 \rightarrow B$ 对于 1 的几何重数为 1. $\rightarrow B \sim A.$

而 $A = \begin{bmatrix} N_1 & \\ & N_2 \end{bmatrix}$ 时, 可知: $B = \begin{bmatrix} P_1^{-1} & \\ & P_2^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1(1) & \\ & J_2(1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1 & \\ & P_2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} J_1(1) & \\ & J_2(1) \end{bmatrix} \parallel I+A.$

事实上, 用同样的方法可证: 对于任意 $m \geq 1$, 均有:

$I+A \sim I+A + \frac{1}{2!}A^2 + \dots + \frac{1}{m!}A^m$ (更一般情况即 P2.14) □

T2.15. 考虑: $A = J_n(\lambda_1) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & \\ & \lambda_1 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_1 \end{bmatrix}$. 如果可证: $A^m \sim J_n(\lambda_1^m)$ 那么即可得证.

我们可取 $B = P[J_n(\lambda_1^m)]P^{-1}$.

而证明与 T2.11 (上题) 类似, 我们考虑 A^m 关于 λ_1^m 的 Jordan 块个数 (即几何重数):

$A = \lambda_1 E + N \quad \therefore A^m = \lambda_1^m E + \underbrace{C_m^1 \lambda_1^{m-1} N}_{\neq 0} + \dots + C_m^{m-1} \lambda_1 N^{m-1} + N^m$

$R(A^m - \lambda_1^m E) = n-1 \rightarrow$ 几何重数为 1.

从而 A^m 只有一个 λ_1^m 对应的 Jordan 块, 即: $A^m \sim J_n(\lambda_1^m).$ □

T2.14. 换言之: 即 $A \sim \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & & \\ & \dots & \\ & & J_{k_r}(\lambda_r) \end{pmatrix}$ λ_i 可能相同.

多项式 $f: \downarrow f'(\lambda_i) \neq 0$

$f(A) \sim \begin{pmatrix} J_{k_1}(f(\lambda_1)) & & \\ & \dots & \\ & & J_{k_r}(f(\lambda_r)) \end{pmatrix}$

同样的, 我们先考虑一个 Jordan 块的情况 $A = J_n(\lambda_1)$.

以及考虑 f 为单项式 $f = ax^m$ 的情况:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_1 & \\ & & & \lambda_1 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

$$aA^m = \begin{pmatrix} a\lambda_1^m & aC_m^1 \lambda_1^{m-1} & aC_m^2 \lambda_1^{m-2} & \dots \\ & a\lambda_1^m & & \vdots \\ & & \ddots & aC_m^2 \lambda_1^{m-2} \\ & & & aC_m^1 \lambda_1^{m-1} \\ & & & & a\lambda_1^m \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a\lambda_1^m & af'(\lambda_1) & \dots & * \\ & a\lambda_1^m & \dots & \\ & & \ddots & af'(\lambda_1) \\ & & & a\lambda_1^m \end{pmatrix} \text{非零}$$

于是由条件 $f'(\lambda_1) \neq 0$. $\therefore R(aA^m - a\lambda_1^m I) = n-1 \rightarrow n$ 个重数 $\neq 0$.

i.e. $aA^m \sim J_n(a\lambda_1^m)$.

于是完全可以记得 $f \in C[\lambda]$ 的命题. 当 A 可逆时:

对应于 $\frac{1}{\lambda}$ $A^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda^{-1} & & & \\ & -\lambda^{-2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & -\lambda^{-2} \\ & & & & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$ 对应于 $(\frac{1}{x})'$. \rightarrow 从而此时 $f \in C[\lambda, \frac{1}{\lambda}] \vee$ \square .

问题: 如果 $f'(\lambda_i) = 0$ 怎么办? 考虑一种简单的情况:

$A = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} = J_n(0)$, $f(x) = x^2$ 时, 也就是 A^2 的 Jordan 标准型?
 \downarrow
 $f'(0) = 0$

Answer: 在 2024.12.7 的高代中 Jordan 标准型有解答.

T2.22 考虑 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{bmatrix} = J_n(\lambda)$.

从而 e^A 对角线元素为: $1 + \lambda + \frac{1}{2!}\lambda^2 + \dots + \frac{1}{n!}\lambda^n + \dots = e^\lambda$.

$\therefore \det(e^A) = e^{n\lambda} = e^{\text{tr}(A)}$.

Rmk: 应用于 ODE 线性 的解:

eg. $\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \frac{d}{dx} y = \begin{pmatrix} 2y_1 + y_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} y$.

于是其解为: $y = C \cdot e^{Ax}$ 定义如 T2.22.

□.

T2.20. $\varphi_A = d_A \Rightarrow$ 每个不同特征的 λ_i 只有一个 Jordan 块. ... 只有一个 λ_i 的初等因子.
 很重要的 Γ 一般性结论. $A = \begin{bmatrix} J(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J(\lambda_k) \end{bmatrix}$ λ_i 各不相同. 条件 1.

为简便, 我们令 $A = \begin{bmatrix} J(\lambda_1) & \\ & J(\lambda_2) \end{bmatrix}$, 将 B 分块: $\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$

$AB = BA$ $\begin{bmatrix} J(\lambda_1)B_{11} & J(\lambda_1)B_{12} \\ J(\lambda_2)B_{21} & J(\lambda_2)B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11}J(\lambda_1) & B_{12}J(\lambda_2) \\ B_{21}J(\lambda_1) & B_{21}J(\lambda_2) \end{bmatrix}$

\therefore 对任意的 i, j , 应该有: $J(\lambda_i)B_{ij} = B_{ij}J(\lambda_j)$ 展开硬算 $\Rightarrow B_{ii} = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ & a & b & d \\ & & a & b \\ & & & a \end{pmatrix}$

而显然 B_{ii} 可由 $(J(\lambda_i) - \lambda_i E)$ 的多项式 也就是 $J(\lambda_i)$ 的多项式表示.

($i \neq j$ 时)
 $(J(\lambda_i) - \lambda_i E)^n B_{ij} = B_{ij}(J(\lambda_j) - \lambda_j E)$
 \parallel
 0
 $\Rightarrow B_{ij} = 0$ 条件 2.

根据 T2.12 中国剩余定理 的应用, 可知 B 最终可写为 A 的多项式.

\uparrow
 条件 1 与条件 2 等价的关键.

T2.16. ① 假设:

$$A = \begin{pmatrix} J(\lambda_1) & & \\ & J(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & J(\lambda_g) \end{pmatrix}$$

其中 λ_i 各不相同.

↳ 对应于 T2.20 的非减次方阵.

于是按照 T2.20 的做法, 对 X 分块得:

$$J(\lambda_i) X_{ij} = X_{ij} J(\lambda_j)$$

$$\text{于是: } X = \begin{pmatrix} f_1(J(\lambda_1)) & & \\ & f_2(J(\lambda_2)) & \\ & & \ddots \\ & & & f_g(J(\lambda_g)) \end{pmatrix}$$

↳ $\{f_i\}$ 的维数为 n_i .

再记 $J(\lambda_i)$ 的大小为 $n_i \times n_i$ 的, 故 $J(\lambda_i)$ 的极小多项式次数为 n_i .

$$\therefore \dim\{X\} = \dim\{f_1\} + \dots + \dim\{f_g\} = \sum_{i=1}^g n_i$$

② 现在考虑: A 有两个以上相同特征值的 Jordan 块.

$$\text{为简便, 考虑 } A = \begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda) & & \\ & J_{n_2}(\lambda) & \\ & & \ddots \\ & & & J_{n_k}(\lambda) \end{pmatrix} \rightarrow \text{相同特征值.}$$

但由 $AX = XA$ 仍有:

$$J_{n_i}(\lambda) X_{ij} = X_{ij} J_{n_j}(\lambda)$$

$$\text{设 } n_i < n_j \quad \underbrace{(J_{n_i}(\lambda) - \lambda_1 E)^{n_i}}_0 X_{ij} = \underbrace{X_{ij} (J_{n_j}(\lambda) - \lambda_1 E)^{n_i}}_{\text{未知.}}$$

$$\text{也就是 } 0 = X_{ij} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 0 \\ & & & & & & 0 \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix} \Bigg\} n_j$$

$$\text{从而 } \dim\{X_{ij}\} = n_i = \min\{n_i, n_j\}$$

$$\therefore \dim\{X\} = \sum_{\text{任意 } i,j} \{X_{ij}\} = \sum_{\substack{1 \leq i \leq k \\ 1 \leq j \leq k}} \min\{n_i, n_j\}$$

$n_i(\lambda)$ 对应于 λ 的第 i 个 Jordan 块.

$$\text{③ 结合 ①② 使得一般情况: } \dim\{X\} = \sum_{g \text{ 个特征值}} \sum_{1 \leq i,j \leq k_g} \min\{n_i(\lambda_g), n_j(\lambda_g)\}$$

T2.17. 可由 T2.16 的证明过程直接得到. 只是变成 $J_A(\lambda_i)X_{ij} = X_{ij}J_B(\lambda_j)$.

T2.21. 由于 $AB = BA$, 因此可同时上三角化.

证. 可令 A, B 已然是一个上三角阵.

$$\begin{array}{ccc} \Downarrow & \nearrow & \\ \begin{pmatrix} \Lambda_A & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & & \begin{pmatrix} \Lambda_B & * \\ 0 & b \end{pmatrix} \end{array}$$

从而由 $AB = 0$ 得. $\boxed{\Lambda_A} \Lambda_B = 0 \Rightarrow \Lambda_B = 0$.
可逆.

也就是 $R(B) \leq 1$. 当 $R(B) = 0$ 即 $B = 0$ 是显然的, 而当 $R(B) = 1$ 时的情况:

由于 $R(A) = n-1 \therefore 0$ 是一个特征值, $d_A(x) = x \cdot q(x)$

$$\therefore d_A(A) = A \cdot \underbrace{q(A)}_{\neq 0 \text{ 就是 } B} = 0$$