

数学外卖线性代数讲座——相似矩阵与二次型、线性空间

李长浩、梁海纳

2024年12月15日

1 相似矩阵

题目 1.1. 设 V 是三维实向量空间，内积为标准内积，又已知三个线性无关的向量：

$$u_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 11 \end{pmatrix}$$

用 *Gram-Schmidt* 方法求得一组标准正交基。

题目 1.2. 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 求行列式 $|A^3 - 6A^2 + 11A - 6I|$ 。

题目 1.3. 设三阶矩阵 A 等于

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & t \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

问 t 为何值时 A 能对角化？

题目 1.4. 设 A 为 4 阶对称矩阵，且 $A^4 + 2A^3 = O$ ，若 A 的秩为 3，则 A 相似于：

$$A. \begin{pmatrix} -2 & & & \\ & -2 & & \\ & & -2 & \\ & & & -2 \end{pmatrix} \quad B. \begin{pmatrix} -2 & & & \\ & -2 & & \\ & & -2 & \\ & & & 0 \end{pmatrix} \quad C. \begin{pmatrix} -2 & & & \\ & -2 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix} \quad D. \begin{pmatrix} -2 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

题目 1.5. 设 A 和 B 是二阶矩阵，且 $AB = BA$ 。则“ A 有两个不相等的特征值”是“ B 可对角化”的

- (A) 充要条件 (B) 充分不必要条件
(C) 必要不充分条件 (D) 不充分也不必要条件

2 二次型

题目 2.1. 设 A 为 n 阶实对称矩阵， $r(A) = n$ ， A_{ij} 是 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式 ($i, j = 1, 2, \dots, n$)，二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{|A|} x_i x_j$$

记 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ ，证明二次型 $f(\mathbf{x})$ 的矩阵为 A^{-1} 。

题目 2.2. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_3$, $g(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3$

- (1) 求一个可逆矩阵 C , 使得 $f(x_1, x_2, x_3)$ 可用合同变换 $x = Cy$ 化为规范型;
- (2) 记 $g(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 B , 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T(C^TBC)Q$ 为对角矩阵;
- (3) 求一个可逆矩阵 T , 使得在合同变换 $x = Ty$ 下可将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 与 $g(x_1, x_2, x_3)$ 同时化为标准型.

题目 2.3. 设多项式 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_3 + x_2$

- (1) 写出该多项式的二次型部分的矩阵 A ;
- (2) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$;
- (3) $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 表示什么曲面? 请说明理由.

题目 2.4. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$.

- (1) 求正交变换 $x = Qy$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型;
- (2) 证明: $\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2$;

题目 2.5. 设实矩阵 $A = \begin{bmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{bmatrix}$, 若对任意实向量 $\alpha = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$, $(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \beta^T A \beta$ 恒成立, 则 a 的取值范围是 _____

题目 2.6. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 与 A 合同但不相似的矩阵为 ()

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

题目 2.7. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$ 的负惯性指数 q 为 _____

3 线性空间

题目 3.1. 设 V 为所有二阶方阵, 按照通常矩阵的加法和数乘所构成的线性空间. 给定可逆矩阵 P 在 V 上定义如下相似变换 $T(A) = P^{-1}AP$.

1. 证明 T 是 V 上的一个线性变换.
2. 如果 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求出线性变换 T 在如下基下的矩阵:

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$